





Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko



Ukrepi za izboljšanje uspešnosti pripustov



Milena KOVAC

Vsebina




- **Mladice**
 - Vzreja mladic
 - Izbor matere
 - Rast in razvoj
 - Stimulacija spolne zrelosti
- **Stare svinje**
 - Oskrba pred pripustom
 - Uhlevitev
 - Stimulacija estrusa

Izbor matere




- Maternalna pasma
- Ni prenašalka dednih napak
- Velika gnezda ob rojstvu
- Veliko mleka in dobre materinske lastnosti
- Reprodukcijski ciklus kratek <160 dni
- Dobro izražen in spontan estrus
- Brez hormonske stimulacije estrusa



Rast in razvoj





- Priprava na odstavitev
- Odstavitev in uspešen prehod
- Ločeno od 18 kg dalje
- Pogoji: prostor, svetloba, obogatitev, človek
- Od rojstva do odbire: 650 g/dan
- Odbira: na osnovi meritev in AGV




Dnevni prirast mladic



Starost ob pripravi





Stimulacija spolne zrelosti





- Mladice uhlevljene skupaj
- Stik z merjascem samo po 160. dnevnu
- Odkrivanje bukanja in evidenca
 - Prvo bukanje: ~180 dni
 - Pripust pri 3. - 4. estrusu: ~220 dni
- Izločamo mladice z zaostankom bukanja



Interim obdobje - kmetije





Interim obdobje - farma




Interim in gnezdo - farma



Interim in gnezdo - kmetije




Stimulacija estrusa




- Odstavljene svinje uhlevljene skupaj
- “Vasovanje” merjasca (3 dni)
- Pri glavi ali iz vseh strani
- Odkrivanje bukanja (4. dan) – krajši čas
- Odkrivanje bukanja (5. dan) – brez merjasca
- Osemenjevanje: prisotnost merjasca

Napake pri odkrivanju bukanja




- Pomanjkanje znanja in zavzetosti delavca
- Pomanjkanje izkušenosti delavca
- Preveč dela
- Premalo časa porabljenega za opazovanje živali
- Pomanjkanje svetlobe (možno branje časopisov, ...)
- Mrzlo ali vroče
- Prevelika gostota v skupini
- Izostanek stimulacije merjasca
- Bolečine, zlasti pri stoji
- Agresija ljudi ali drugih živali
- Slab libido, prekomerna masa, bolezen merjasca

Vzroki za izostanek bukanja




- **Spolna nedozorelost mladic**
- **Slabo okolje**
- **Prerivanje, stres**
- **Bolezen, bolečina, opeklne, poškodbe na koži**
- **Prevelika gostota živali**
- **Pomanjkanje kontakta z merjascem**
- **Slaba osvetlitev**
- **Neustrezna prehrana, kondicija svinje**
- **Slaba oskrba in ravnanje**


Individualna uhlevitev



- Odstavljene svinje na sosednjih stojiščih
- Merjasec na hodniku
 - Pri glavi
 - Stik z vse



Skupinska uhlevitev



- Odstavljene svinje v večji skupinski kotec
- Obogatitev okolja (slama, ovire)
- Prisotnost merjasca
- Vzpostavitev ranga
- Lahko ostanejo v skupini

